

**Questão Discursiva 01885**

Mulher de 60 anos, diabética, apresentou choque séptico de foco pulmonar há 2 dias. Na entrada, apresentava infiltrado pulmonar bilateral difuso e necessitou de altas frações inspiradas de O<sub>2</sub> e PEEP 12. Nesse período, administrou-se reposição volêmica vigorosa com 6 L de SF = 0,9%, antibiótico, droga vasoativa e ventilação mecânica protetora. Encontra-se em processo de melhora do choque, em ventilação mecânica, com melhora também do infiltrado pulmonar, mas ainda presente bilateralmente, FiO<sub>2</sub> = 50%; PEEP de 8 cm. Recebe dieta enteral, SF = 0,9%, droga vasoativa, antibiótico, sedação e profilaxias. A gasometria arterial atual mostra pH = 7,20; HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> = 10 mg/dL; pCO<sub>2</sub> = 23; Cl<sup>-</sup> = 120 mEq/L; Na<sup>+</sup> = 140 mEq/L; pO<sub>2</sub> = 90 mmHg; Sat O<sub>2</sub> = 95%.

a) Qual(is) o(s) distúrbio(s) ácido-básico(s) encontrado(s)?

b) Qual(is) a(s) causa(s) do distúrbio(s) ácido-básico(s) encontrado(s)?

c) Qual(is) a(s) medida(s) terapêutica(s) para corrigir o(s) distúrbio(s) encontrado(s)?

d) Segundo a definição de Berlin para síndrome do desconforto respiratório agudo, qual o diagnóstico em relação ao quadro respiratório?